

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Тонзипрет®

Торговое название: Тонзипрет®

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания гомеопатические.

Состав (на 1 таблетку):

Активные компоненты:

Phytolacca Americana Ø	50,00 мг
Capsicum D3	75,00 мг
Guaiaicum D3	75,00 мг

Вспомогательные вещества:

Лактозы моногидрат

Магния стеарат

Крахмал картофельный

Описание

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской, белые с желтоватым оттенком.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Фармакологические свойства

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Показания к применению

В комплексной терапии как симптоматическое средство при боли в горле.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст (до 18 лет) – из-за недостаточности клинических данных.

В связи с содержанием лактозы препарат не следует принимать пациентам, страдающим непереносимостью лактозы, генетическим дефицитом лактазы или нарушением всасывания глюкозы-галактозы.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания – из-за недостаточности клинических данных.

Способ применения и дозы

При сильных болях в горле для купирования болевого синдрома принимать по 1 таблетке через каждые 30-60 минут, но не более 12 раз в сутки. По мере стихания болей перейти на поддерживающие дозы - по 1 таблетке 1-3 раза в день за 15 минут до еды.

Курс лечения 7-10 дней.

Таблеткам необходимо дать медленно растаять во рту.

Побочное действие

Возможны тошнота, желудочные расстройства, аллергические реакции.

Передозировка

В случае передозировки возможно усиление побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Особые указания

Примечание для больных сахарным диабетом: разовая доза препарата содержит менее 0,03 хлебных единиц.

При наличии постоянных, неясных симптомов или при появлении новых симптомов, а также при высокой температуре, сохраняющейся в течение более трех дней или повышающейся выше 39 °С, следует обратиться к врачу.

При появлении первых признаков аллергической реакции не следует повторно принимать препарат.

При применении гомеопатического препарата возможно обострение уже существующих симптомов. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на управление транспортными средствами и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 25 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и ПВХ/ПЭ/ПВДХ – пленки. По 1, 2, 4 или 8 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Бионорика СЕ, Кершенштайнерштрассе 11-15, 92318, Ноймаркт, Германия

Держатель регистрационного удостоверения

Бионорика СЕ, Кершенштайнерштрассе 11-15, 92318, Ноймаркт, Германия

Производство готовой лекарственной формы

Ротгендорф Фарма ГмбХ, Остенфельдер Штрассе 51-61, 59320 Эннигерло, Германия

Фасовка/Упаковка

Бионорика СЕ, Кершенштайнерштрассе 11-15, 92318, Ноймаркт, Германия

Выпускающий контроль

Бионорика СЕ, Кершенштайнерштрассе 11-15, 92318, Ноймаркт, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

Общество с Ограниченной Ответственностью «Бионорика»

119619 г. Москва, 6-я ул. Новые сады, д. 2, корп. 1.

тел./факс (495) 502-90-19,

адрес электронной почты: info@bionorica.ru